

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP 19-5-81692552

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL : 70 F.

ET FRANCHE-COMTÉ · CÔTE-D'OR · SAÔNE-ET-LOIRE · YONNE · NIÈVRE · JURA · DOUBS · HAUTE-SAÔNE · TERRITOIRE DE BELFORT

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD · B.P. 194 · 21206 BEAUNE CEDEX · Tél. (80) 22.19.38

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture · C.C.P. DIJON 3405.12 K

Bulletin n° 14 - 15 Mai 1981

V I G N E

MILDIOU : Les toutes premières taches de mildiou ont été découvertes le 13 mai, elles proviennent de contaminations qui ont eu lieu vers le 4 ou 5 mai. Les pluies importantes des 10 - 11 et 12 mai ont certainement été à l'origine de nouvelles contaminations qui donneront des taches en début de semaine prochaine.

Les traitements réalisés avec des fongicides préventifs classiques avant le 12 mai ont été lessivés dans de nombreuses situations (le lessivage intervient après des pluies cumulées de 20 - 25 mm). Aussi il convient dans ces cas précis de les renouveler dans les meilleurs délais.

Par contre pour les applications réalisées avec des fongicides pénétrants ou systémiques, nous rappelons qu'elles échappent au lessivage à condition qu'aucune pluie n'intervienne dans l'heure qui suit le traitement.

Pour les caractéristiques de l'ensemble des fongicides actifs contre le mildiou de la vigne se reporter à notre bulletin n° 10 du 23 Avril 1981.

PETITS FRUITS

OIDIUM SUR CASSISSIER : Les premières taches d'oïdium ayant été découvertes dans les Hautes-Côtes de Nuits, il y a lieu d'effectuer le premier traitement en utilisant l'un des produits suivants :

- | | | | |
|---------------|------------------------|--------------|--|
| - ditalimfos | : 50 g./hl (Laptran) | - bupirimate | : 37 g./hl (Nimrod) |
| - triadiméfon | : 7,5 g./hl (Bayleton) | - triforine | : 33,5 g./hl (Saprol) efficace également contre l'Anthracnose. |
| - fénarimol | : 4 g./hl (Rubigan 4) | | |

C É R É A L E S

ROUILLE JAUNE : Outre le foyer sur blé d'hiver à BRANNAY (Nord de l'YONNE), les foyers sur orge d'hiver et escourgeon sont nombreux dans la région de SAINT JULIEN DU SAULT et en PUISAYE. Le traitement doit se réaliser dès l'apparition des premières pustules. Celles-ci sont de couleur jaune orangée, alignées entre les nervures et laissent une poudre jaunâtre au toucher. Ne pas les confondre avec des pustules de ROUILLE BRUNE (ou NAINE sur orge d'hiver et escourgeon) qui se présentent dispersées sur les feuilles.

C O L Z A

ALTERNARIA : Les traitements ne sont pas justifiés actuellement.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,
Chef de la Circonscription phytosanitaire
"Bourgogne et Franche-Comté"

G. VARLET

P178

